

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.



Avertissements[®] agricoles

Abonnement

annuel :

140,00 F

à l'ordre

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

STATION D'AVERTISSEMENTS

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES

Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N° 19 DU 31 JUILLET 1986

F.2.

POMMES DE TERRE : pucerons, doryphore, mildiou**MAIS** : pucerons**BETTERAVES** : pas de maladie

POMMES DE TERRE

SITUATION :

Problèmes physiologiques : boulage important dans certaines parcellesMildiou : les quelques contaminations entre le 14 et 17 juillet ont donné quelques symptômes en jardins entre le 22 et 24 juillet.

Nous avons eu de nouvelles contaminations le 26 avec une sortie de taches probables vers les 3 ou 4 août.

Les doryphores sont toujours signalés dans de nombreuses cultures. Les colonies de pucerons verts s'installent. **Elles risquent** de causer des **dégâts** si le déficit hydrique se poursuit.

PRECONISATIONS :

Mildiou : bien que la pression soit modérée (les générations ne se chevauchent pas), on ne peut se permettre le relâchement : appliquer un contact avant la fin de la semaine ou la prochaine pluie conséquente (si pas de pluie, intervention début semaine prochaine).Pucerons : **intervenez** sur l'installation des colonies de **pucerons verts**.Doryphores : traitez obligatoirement sur constat de présence (produit cf bulletin n°13 du 17 juin).

Dans plusieurs situations, faire un traitement mixte (Decis B par exemple).

MAIS

SITUATION :

Pyrale : de nouveaux contrôles confirment le niveau très bas des pontes dans le Cambrésis (seul secteur contaminé dans le Nord Pas-de-Calais).Les populations de pucerons verts (*metopolophium dirhodum* avec un gros vol le 28 dans la soirée) et *sitobion avenae* progressent malgré les auxiliaires mais ils ne peuvent plus faire de dégâts.

F...52

Les "pucerons noirs" rhopalosiphum padi s'installent, ils peuvent entrainer des dégâts en cas de présence avec miellat sur fleurs mâles et femelles sur 50 % des pieds pendant la fécondation.

PRECONISATIONS : aucun traitement n'est justifié à ce jour, surveiller l'évolution du rhopalosiphum padi.

HARICOTS

INFORMATIONS : la pyrale du maïs peut attaquer le haricot, les dégâts sont négligeables mais la présence de chenilles dans la récolte est un élément de refus.

PRECONISATIONS : les vols sont trop faibles, même dans le Cambrésis, pour envisager un traitement.

BETTERAVES

MALADIES :

Stratégie de lutte : les maladies peuvent justifier deux traitements :

Le premier, plutôt spécifique oïdium (fin juillet- début août) à l'apparition des premiers symptômes, suivi 20 à 30 jours plus tard et au moins 45 jours avant récolte, d'un produit polyvalent.

En cas d'attaque plus tardive (mi-août), on envisagera une seul traitement avec un polyvalent.

SITUATION et PRECONISATIONS :

Maladies : aucune observation d'oïdium, ni de ramularia, **aucun traitement n'est justifié.**
Présence de noctuelles et de pucerons noirs qui ne justifie pas de traitements spécifiques.

SPECIALITES HOMOLOGUEES SUR MALADIES DU FEUILLAGE DE LA BETTERAVE

	MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES	Dose homologuée (kg ou l/ha)			
			oïdium	cerco.	ramu.	rouille
O I D I U M	soufre micronisé	MICROTHIOL, THIOVIT..	8,0			
	carb. + manèbe + soufre	BLEDOR 3, VOLNEBE	8,0			
	fénarimol	RUBIGAN	1,0			
	triadiméfon	BAYLETON 25	1,0			
A U T R E S	bénomyl, carbendazime	Nombreuses spécialités		0,3		
	thiabendazole	TEBUZATE		0,2		
	méthylthiophanate + manèbe	PELTAR		2,0		
	fentine acétate + manèbe	BRESTAN 10		2,5	2,5	
	mancozèbe	DITHANE LF		7,0	7,0	7,0
		SANDOZEBE		4,5	4,5	4,5
P O L Y V A L E N T S	carb. + triadiméfon	BAYLETON - TOTAL	1,0	1,0		
	méthylthio. + soufre	PELT. S	8,0	8,0		
	méthylthio. + manèbe + S	PELTISAN	8,0	8,0		
	carb. + fénarimol+manèbe	RIMIDINE	2,5	2,5		
	fentine hydroxyde + S	TOPSUC	7,0	7,0	7,0	
	carb. + mancoz.+ fenpropi.	CORVET CM	2,0	2,0	2,0	2,0
	bitertanol	BAYCOR 300 EC	0,8	0,8		0,8
	fluatriafol	IMPACT	1	1	1	1
	fluatriafol +	IMPACT. R	1	1	1	1
	carbendazime	IMPACT. RM	0,8	0,8	0,8	0,8